

## הוראות לאחר טיפול עזרה ראשונה בחלל הפה

טיפול עזרה ראשונה נועד לטפל בכאב או בבעיה אקוטית. כאב חזק מקורו לרוב בדלקת או בתהליך זיהומי בשן או בחניכיים. בעיות שכיחות אחרות הדורשות טיפול עזרה ראשונה כוללות הדבקת שחזורים שנפלו ממקומם, תיקון שברים בשיניים או בתותבות ועוד.

**מאחר ובמסגרת הזמן המוקצב לטיפול עזרה ראשונה לא ניתן על פי רוב לבצע טיפול שלם, מומלץ לקבוע תור מסודר כדי לבצע את הטיפולים ההמשכיים הנדרשים.**

בכדי להקטין את הצורך בטיפול עזרה ראשונה בעתיד, מומלץ להגיע לבדיקה מקיפה במרפאה, שמטרתה לאבחן את מצבך ולהבטיח טיפול מסודר.

באם נעשה טיפול בכאב שמקורו בשן, יש לשים לב להוראות הבאות:

- במידה ונעשה שימוש בחומר סתימה זמנית, יש להמנע מאכילה ושתייה **למשך שעה לפחות** לאחר סיום הטיפול.
- לרוב, צפויה הקלה בכאבים לאחר הטיפול גם בחלוף השפעת האלחוש. אך במקרים יש להמתין להשפעת החומרים שהונחו באזור הכואב או להשפעת התרופות שנרשמו.
- באם נרשמו תרופות אנטיביוטיות ו/או משכך כאבים יש לקחתם על פי הוראות הרופא/ה.

### **יש להתקשר למרפאה מיד אם:**

- מופיעות תופעות כגון פריחה, בחילה, או שינוי בהרגשה כתוצאה מלקיחת התרופות. בכל מקרה, יש להפסיק את נטילת התרופות מיד.
- באם אין הקלה בכאב לאחר 24-48 שעות.
- באם חלה החמרה במצב.
- אם התופעות האלה מתרחשות בשעה שהמרפאה סגורה, יש לפנות לבית החולים הקרוב.

על פי הערכת המצב הנוכחית המשך הטיפול באזור או בשן זו יכלול:

---

---

---

נייד: 0544-58-22-23  
www.drsamet.com

מרפאה: 072-2829-567  
פקס: 072-2829-678  
office@drsamet.com

רחוב הלטינקי 11  
תל אביב 62996